

## عوارض سقط جنین



## عوارض سقط جنین

### بستری در بیمارستان :

برآورد میشود که هر ساله حدود پنج میلیون زن در سراسر جهان به دلیل عوارض ناشی از سقط های القایی در بیمارستان ها بستری می شوند. تعداد قابل توجهی از این افراد، خانم هایی هستند که به دنبال عوارض ناشی از سقط های غیر ایمن به بیمارستان مراجعه میکنند. در این خانم ها عوارضی شامل نارسایی کلیه، خونریزی های شدید، خونریزی های متوسط یا غیر مشخص، عفونت های شدید، عفونت های شدید یا نامشخص، کم خونی و مرگ زن باردار مشاهده شده است.

### خونریزی :

یکی از شایع ترین عوارض سقط غیر ایمن بوده و میتواند به دلیل پاره شدن واژن، گردن رحم، رحم، بافت های رحمی، عفونت و آتونمی رحم (به دلیل باقی ماندن بقایای بارداری در بسیاری از موارد) رخ دهد. خونریزی می تواند شوک (به دلیل کاهش حجم خون در گردش) اختلالات انعقادی و مرگ را به دنبال داشته باشد.

### افسردگی:

در بررسی های انجام شده دیده است که اختلالات خلقی از جمله افسردگی در خانم هایی که سابقه سقط را دارند بیشتر دیده می شود. احتمال بروز افسردگی با تعداد سقط افزایش می یابد.

سالانه حدود ۴۲ میلیون سقط عمدی در جهان رخ میدهد. از این تعداد حدود ۲۲ میلیون آن در شرایط بهداشتی و حدود ۲۰ میلیون آن در شرایط غیر ایمن صورت میگیرد.



**براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، سقط غیرایمن عملی است که در آن حاملگی توسط یک فرد فاقد مهارت های لازم یا استفاده کننده از روش های خطرناک و یا در محیطی که از حداقل استانداردهای لازم برخوردار نیست و یا ترکیبی از هر دو مورد یاد شده پایان می یابد. سقط های خودبخودی که به دنبال آنها عفونت یا عوارض دیگر بروز نماید، سقط های غیر ایمن طبقه بندی می شوند.**